

Кључне поруке за све лекаре који прописују лекове

Шта можете учинити

1. Научите и примените све препоруке о употреби антибиотика и превенцији и контроли инфекција које су релевантне за Вашу област специјализације [стручни консензус].
2. Ако приметите да особље у болници или здравственој установи крши смернице или протоколе, питајте их зашто то раде и обезбедите им литературу и водиче помоћу којих ће разумети у чему греше [69] [стручни консензус].
3. Будите упознати са локалним обрасцима резистенције на антибиотике у Вашем одељењу, Вашој болници и у заједници [31] [стручни консензус].
3. Ако сте у недоумици пре прописивања антибиотика, требало би да [25,26,53,70] [стручни консензус]:
 - Проверите локалне, регионалне и националне епидемиолошке податке;
 - Потражите смернице и савет од искуснијег колеге или члана тима за управљање употребом антибиотика.
4. Обезбедите да се узорци за културе правилно узму и пошаљу у микробиолошку лабораторију пре започињања антибиотске терапије [31,42,70,71].
5. Започните лечење антибиотцима само ако постоје докази о бактеријској инфекцији, а не лечите колонизацију [31,72].
6. Избегавајте непотребну антибиотску профилаксу [31,73].
7. За пацијенте са тешким инфекцијама, започните ефикасно лечење антибиотцима што је пре могуће [31,74].
8. Документујте индикацију за антибиотско лечење, избор лека, дозу, пут примене и трајање лечења у картону пацијента [31,42,70,71].
9. Редовно учествујте у курсевима обуке и састанцима који подржавају имплементацију следећих пракси у болници: а) рационалне употребе антибиотика, б) локалних смерница за антибиотике заснованих на доказима и в) мера превенције и контроле инфекција [52,53].

10. Одговорите на следећа кључна питања када поново процењујете антибиотску терапију након 48–72 сата (или чим микробиолошки резултати постану доступни) [42,70]:

Да ли пацијент има инфекцију која ће реаговати на антибиотике? Ако да:

- i. Да ли пацијент прима одговарајући антибиотик(е), одговарајућу дозу одговарајућим путем примене?
- ii. Да ли би се могао користити антибиотик ужег спектра за лечење инфекције?
- iii. Колико дуго би пацијент требало да прима антибиотик(е)?