

# Úsáid ábhar frithmhiocróbach in ospidéil Eorpacha agus in áiseanna cúraim fhadtéarmaigh

Baintear úsáid as ábhair fhrithmhiocróbacha – antaibheathaigh den chuid is mó – go coitianta in ospidéil agus in áiseanna cúraim fhadtéarmaigh chun ionfhabhtuithe a chóireáil nó a chosc. D'fhéadfadh cuid den úsáid seo a bheith neamhriachtanach agus, dá bhrí sin, a bheith ag cur le teacht chun cinn agus le leathnú na frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh. In 2016 agus 2017, chomhordaigh ECDC dhá shuirbhé ar leitheadúlacht trátha Eorpach in ospidéil ghéarchúraim agus in áiseanna cúraim fhadtéarmaigh, faoi seach.



Úsáid fhrithmhiocróbach in:  
**Ospidéil**



Fuair  
**1 othar as gach 3**  
otharábhar  
frithmhiocróbach amháin  
ar a laghad ar aon lá áirithe.

## Próifíolacsas máinliachta



Ordaíodh 1 as gach 2 chúrsa próifíolacsais máinliachta ar feadh níos mó ná aon lá amháin.



De ghnáth is leor dáileog amháin do phróifíolacsasmáinliachta. Léiríonn próifíolacsas máinliachta fada foinse shuntasach d'úsáid neamhriachtanach fhrithmhiocróbach in ospidéil.

## Próifíolacsas liachta



Bhain 1 as gach 10 oideas frithmhiocróbach le próifíolacsas míochaine, agus níl ach líon teoranta tásca ann ina leith sin.

Mar sin d'fhéadfadh cion na n-oideas frithmhiocróbach do phróifíolacsas míochaine a bheith ina úsáid neamhriachtanach.



## Úsáid tuismitheoirí

Tugadh 7 as 10 gcinn de fhrithmhiocróbáin go páireintreach. Níor tuairiscíodh malartú ó phaireintreach go béal ach amháin i 4% de na hoidis a bhaineann le fhrithmhiocróbáin phaireintreacha.

## Antaibheathaigh speictrim leathain

Bhí cion na n-antaibheathach speictrim leathain a úsáideadh ar fud na hEorpa idir 16% agus 62%. Léiríonn an éagsúlacht leathan ina n-úsáid an riachtanas atá ann athbhreithniú a dhéanamh ar a dtásca i mórán tíortha agus ospidéal.

Níl antaibheathaigh speictrim leathan riachtanach i gcónaí agus spreagann a n-úsáid frithsheasmhacht in aghaidh ábhar fhrithmhiocróbach.

**16 % - 62 %**

