

Messaġġi ewlenin: L-użu antimikrobiku f'ambjent ta' kura tas-saħħha

Fl-2016-2017, I-ECDC ikkoordina t-tieni stħarriġ dwar il-prevalenza puntwali ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħha u l-użu antimikrobiku fi sptarijiet Ewropej ta' kura akuta u t-tielet stħarriġ dwar il-prevalenza puntwali ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħha u l-użu antimikrobiku fil-facilitajiet Ewropej ta' kura fit-tul. Is-sejbiet huma miġbura fil-qosor fi tliet artikli tal-*Eurosurveillance*:

[Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey \(PPS\) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017.](#) Euro Surveill. 2018;23(46):1800393. Plachouras D, Kärki T, Hansen S, Hopkins S, Lyytikäinen O, Moro ML, et al.

[Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017.](#) Euro Surveill. 2018;23(46):1800394. Ricchizzi E, Latour K, Kärki T, Buttazzi R, Jans B, Moro ML, et al.

[Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017.](#) Euro Surveill. 2018;23(46):1800516. Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, et al.

Il-messaġġi ewlenin huma bbażati fuq ir-riżultati tal-istħarriġiet dwar il-prevalenza puntwali.

L-użu antimikrobiku fi sptarijiet Ewropej ta' kura akuta

L-aġenti antimikrobiċi għall-kura tal-infezzjonijiet jistgħu jsalvaw il-ħajja, iżda l-użu żejjed tal-antimikrobiċi jista' jirriżulta f'effetti negattivi aktar frekwenti u l-emerġenza ta' mikroorganiżmi rezistenti għal ħafna medicini.

1 minn 3 pazjenti rċieva tal-anqas antimikrobiku wieħed f'għurnata partikolari.

L-antimikrobiċi xi kultant jingħataw lill-pazjenti biex jiġu evitati l-infezzjonijiet, pereżempju biex jiġu evitati l-infezzjonijiet b'rabta ma' proċeduri kirurġiċi.

1 minn 2 korsijiet tal-profilassi kirurġika ġie preskritt għal aktar minn ġurnata.

Doża waħda hija normalment bizzżejjed għal profilassi kirurġika. Profilassi kirurġika mtawla tirrappreżenta sors sinifikanti ta' użu mhux meħtieġ ta' antimikrobiċi fl-isptarijiet, kwistjoni li jeħtieġ tiġi indirizzata fl-Ewropa kollha.

1 minn 10 preskrizzjonijiet antimikrobiċi kienu għall-profilassi medika, li għaliha hemm biss numru limitat ta' indikazzjonijiet.

Proporzjon ta' preskrizzjonijiet antimikrobiċi għall-profilassi medika għaldaqstant tista' tirrappreżenta użu mhux meħtieġ.

Il-proporzjon ta' antibijotici b'azzjoni mifruxa varja minn 16 % għal 62 % fl-Ewropa kollha.

L-antibijotici b'azzjoni mifruxa mhumiex dejjem meħtieġa u l-użu tagħhom huwa motivatur tar-reżistenza għall-antimikrobiċi. Il-varjazzjoni wiesgħa fl-użu tagħhom tindika l-bżonn li jiġu rieżaminati l-indikazzjonijiet tagħhom f'bosta pajjiżi u sptarijiet.

7 minn 10 antimikrobiċi ġew amministrati b'mod parenterali. Il-bidla minn parenterali għal orali ġiet irrappurtata f'4 % biss tal-preskrizzjonijiet ta' antimikrobiċi parenterali.

76 % tal-isptarijiet irrappurtaw id-disponibbiltà tal-linji gwida dwar l-użu antimikrobiku. 54 % irrappurtaw xi ħin iddedikat mill-persunal għall-amministrazzjoni antimikrobika.

L-użu antimikrobiku fil-facilitajiet Ewropej ta' kura fit-tul

L-antimikrobiċi normalment jiġu preskritt u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' rezistenza għall-antimikrobiċi fil-facilitajiet ta' kura fit-tul (LTCFs).

1 minn 20 residenti rċieva minn tal-inqas antimikrobiku wieħed f'ġurnata partikolari.

7 minn 10 antimikrobiċi ġew preskitti għall-kura ta' infezzjoni u 3 minn 10 għal profilassi.

3 minn 4 korsijiet tal-profilassi ngħataw biex jiġu evitati infezzjonijiet fil-kanal tal-awrina. Filwaqt li din il-prattika tista' tnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni fin-nisa, m'hemm l-ebda evidenza dwar l-effettivitā tagħha meta tiġi applikata fuq firxa wiesgħa fuq il-pazjenti anzjani. Barra minn hekk, din il-prattika hija assoċjata ma' żieda fir-reżistenza għall-antimikrobiċi. Il-maġgoranza tal-korsijiet tal-profilassi għaldaqstant jistgħu jirrappreżentaw użu mhux meħtieġ ta' antimikrobiċi.

Skont il-pajjiż, l-LTCFs kollha jkollhom linji gwida dwar l-użu antimikrobiku jew l-ebda LTCF ma jkollha linji gwida dwar l-użu antimikrobiku. Barra minn hekk, 1 biss minn 5 LTCFs tingħata taħriġ regolari dwar il-preskrizzjoni adegwata ta' antimikrobiċi.

Infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħha u rezistenza għall-antimikrobiċi fi sptarijiet Ewropej ta' kura akuta u facilitajiet Ewropej ta' kura fit-tul

Għalkemm xi infezzjonijiet li jittieħdu mill-isptar (HAIs) jistgħu jiġu kkurati b'mod faċli, oħrajn jistgħu jaffettwaw b'mod aktar serju s-saħħha tal-pazjenti, u b'hekk iżidu d-dewmien tagħhom fl-isptar u l-ispejjeż tal-isptar. Biss biss l-HAIs fl-isptarijiet waħidhom jikkawżaw aktar imwiet fl-Ewropa minn kwalunkwe marda infettiva oħra taħt is-sorveljanza tal-ECDC.

F'ġurnata partikolari:

- 1 minn 15-il pazjent tal-isptar għandu minn tal-inqas HAI waħda;
- 98,000 pazjent għandhom minn tal-inqas HAI waħda;
- 1 minn 24 resident f'faċilità ta' kura fit-tul għandu minn tal-inqas HAI waħda;
- 124,000 resident għandhom minn tal-inqas HAI waħda;

Huwa stmat li total ta' 8.9 miljuni HAIs iseħħu kull sena fl-isptarijiet u fil-faċilitajiet Ewropej ta' kura fit-tul f'daqqa.

HAIs fl-isptarijiet (pereżempju, il-pulmonite, infezzjonijiet fis-sit kirurġiku u infezzjonijiet fil-fluss tad-demm) normalment huma aktar severi u għandhom impatt akbar minn HAIs fil-faċilitajiet ta' kura fit-tul (pereżempju, infezzjonijiet respiratorji li mhumiex pulmonite, infezzjonijiet fil-kanal tal-awrina, u infezzjonijiet tal-ġilda u tat-tessut artab).

Aktar min-nofs ta' ċerti HAIs huma meqjusa li jistgħu jiġu evitati.

HAIs huma ta' spiss ikkurati mingħajr ma jittieħdu kampjuni mikrobijoloġiči jew il-kampjuni jibqgħu negattivi.

Il-mikroorganiżmu responsabbli ġie identifikat fi 53 % tal-HAIs fl-isptarijiet u biss f'19 % tal-HAIs fil-faċilitajiet ta' kura fit-tul.

1 minn 3 batterji assoċjati ma' HAIs, kemm fl-isptarijiet kif ukoll fil-faċilitajiet ta' kura fit-tul, kien reżistenti għall-antibijotici.

X'inhu stħarriġ dwar il-prevalenza puntwali? Stħarriġ dwar il-prevalenza huwa l-ġħadd tan-numru ta' pazjenti b'kundizzjoni/kura partikolari (f'dan il-każ jew infezzjoni assoċjata mal-kura tas-saħħha jew aġġent antimikrobiku) f'hin partikolari (f'dan il-każ ġġurnata), bħala proporzjon tan-numru totali ta' pazjenti li jiddaħħlu l-isptar f'dak il-ħin partikolari.