



Používání antimikrobiálních látek:

Zařízení dlouhodobé péče



1/20

pacientů v těchto zařízeních dostávala každodenně nejméně jednu antimikrobiální látku.



7/10

antimikrobiálních látek bylo předepsáno k léčbě infekce a 3 z 10 za účelem profylaxe.



3/4 cyklů profylaktické léčby

byly předepisovány za účelem prevence infekcí močových cest. I když tato praxe může snižovat riziko infekcí u žen, neexistují žádné důkazy o účinnosti takové léčby v případě, kdy se v široké míře používá u starších pacientů.

Tento postup je navíc spojován se zvýšenou antimikrobiální rezistencí. Většina případů profylaktické léčby tedy představuje zbytečné používání antibiotik.

Řešení


V boji proti antimikrobiální rezistenci je zásadní uvážlivé používání antimikrobiálních látek ve zdravotnických zařízeních. V nemocnicích a zařízeních dlouhodobé péče je možné provést tato opatření:



Zabránit prodlužované a zbytečné antimikrobiální profylaxi



Pokud je to možné, používat antibiotika s úzkým spektrem



Pokud je to možné, provádět vhodně načasovaný přechod z parenterální na perorální formu



Vždy zdokumentujte indikaci antimikrobiální léčby, volbu léčiva, dávku, způsob podání a dobu trvání léčby v pacientově chorobopisu



Zavádět programy dohledu nad používáním antimikrobiálních přípravků