



Brug af antimikrobielle stoffer på:
Langtidsplejefaciliteter



1 ud af 20

beboere fik mindst ét antimikrobielt stof på en vilkårlig dag.



7 ud af 10

antimikrobielle stoffer blev ordineret som behandling for en infektion, og tre ud af ti som forebyggelse.



3/4 af de forebyggende behandlinger

blev givet for at forebygge urinvejsinfektioner. Selvom denne praksis kan mindske risikoen for infektioner hos kvinder, er der ingen dokumentation for, at den er effektiv, når den anvendes bredt hos ældre patienter.

Denne praksis er desuden forbundet med øget antimikrobiel resistens. De fleste forebyggende behandlinger kan derfor være årsag til unødvendig brug af antimikrobielle stoffer.

Løsninger

Det er afgørende for at kunne bekæmpe antimikrobiel resistens, at de antimikrobielle stoffer bruges med omtanke i sundhedsmiljøer. Følgende foranstaltninger kan træffes på hospitaler og langtidsplejefaciliteter:



Undgå forlænget og unødvendig antimikrobiel forebyggelse.




Anfør altid indikationen for antimikrobiel behandling, det valgte lægemiddel, dosis, administrationsvej og behandlingens varighed i patientjournalen.



Brug smalspektret antibiotika, når det er muligt.



Gennemfør forvaltningsprogrammer for antimikrobielle stoffer.



Skift på rette tidspunkt fra parenteral til oral indgivelse, hvis det er muligt.