



Antimikroobikumide kasutamine

pikaajalise hoolduse asutustes



Ühele 20-st

patsiendist antakse iga päev vähemalt üht antimikroobikumi.



Seitse 10-st

antimikroobikumist määrati infektsioonide raviks ja kolm 10-st profülaktikaks.



Kolm neljandikku profülaktilistest ravikuuridest

toimub kuseteede infektsioonide ennetamiseks. Kuigi see tava võib naistel vähendada infektsioonide riski, puuduvad tõendid selle efektiivsuse kohta ulatuslikul kasutamisel eakatel patsientidel.

Pealegi põhjustab see tava suurenenud antimikroobikumiresistentsust. Enamik profülaktikakuure võivad seepärast olla antimikroobikumide tarbetu kasutamine.

Lahendused

Antimikroobikumide vastutustundlik kasutus tervishoiuasutustes on oluline, et võidelda antimikroobikumiresistentsuse vastu. Haiglates ja pikaajalise hoolduse asutustes saab võtta järgmisi meetmeid.



Vältida pikaajalist ja tarbetut antimikroobikumiprofülaktilikat.




Dokumenteerida alati patsiendi terviseloos antimikroobikumiravi näidustused, valitud ravim, annus, manustamisviis ja ravi kestus.



Kasutada võimaluse korral kitsa spektriga antibiootikume.



Rakendada antimikroobikumikasutuse piiramise kavasid.



Minna võimaluse korral õigel ajal parenteraalselt manustamiselt üle suukaudsele manustamisele.