



## Mikroiläkkeiden käyttö pitkäaikaishoidon laitoksissa



1/20

asukkaista sai vähintään yhtä mikroiläkettä seuranta-aikana



7/10

mikroiläkkeistä määrättiin infektion hoitoon ja kolmessa tapauksessa kymmenestä estolääkitykseksi.



3/4 estolääkityksestä

annettiin virtsatieinfektioiden ehkäisemiseksi. Lääkitys voi pienentää infektoriskiä naisilla, mutta sen vaikuttavuudesta ikääntyneillä potilailla ei ole näyttöä.

Estolääkitys voi siis olla turhaa ja lisätä mikroiläakeresistenssiä.

## Ratkaisut

Mikroiläkkeiden asianmukainen käyttö on tärkeää mikroiläakeresistenssin torjunnassa. Sairaaloissa ja pitkäaikaishoitoksissa resistenssiä voidaan torjua seuraavasti:



Vältetään mikroiläkkeiden pitkäkestoista ja tarpeetonta käyttöä infektioiden ehkäisyssä.




Kirjataan potilaskertomukseen mikroiläkkeiden käytön syy, valittu lääke, annos, annostelutapa ja hoidon kesto.



Käytetään kapeakirjoisia antibiootteja mahdollisuuksien mukaan.



Otetaan käyttöön ohjelmat, joilla tähdätään mikroiläkkeiden käytön vähentämiseen



Siirrytään mahdollisuuksien mukaan parenteraalisesti annettavista lääkkeistä suun kautta annettaviin.