



Úsáid fhríthmhiocróbach in:

Saoráidí cúraim fhadtéarmaigh



1 / 20

Fuair 1 othar as 20 othar ábhar fhríthmhiocróbach amháin ar a laghad ar aon lá áirithe.



Ordaíodh
7 as 10
gcinn

de fhríthmhiocróbáin chun ionfhabhtú a chóireáil agus tugadh 3 as 10 gcinn acu le haghaidh próifíolacsais.




Tugadh **3 as 4** cinn
de na cúrsaí próifíolacsais

chun ionfhabhtú chonair an fhuail a chosc. Cé go bhféadfadh an cleachtas seo an baol ionfhabhtaithe i measc na mban a laghdú, níl aon fhianaise ann maidir lena éifeachtúlacht nuair a chuirtear e i bhfeidhm go forleathan ar othair scothaosta.

Ina theannta sin, baineann an cleachtas seo le frithsheasmhacht mhéadaithe in aghaidh ábhair fhríthmhiocróbaigh. Mar sin, d'fhéadfadh an chuid is mó de chúrsaí próifíolacsais a bheith ina n-úsáid neamhriachtanach d'fhríthmhiocróbáin.

Réitigh

Tá úsáid stuama fhríthmhiocróbach i suíomhanna cúraim sláinte ríthábhachtach chun frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhríthmhiocróbacha a chomrac. Is féidir na gníomhaíochtaí a leanas a dhéanamh in ospidéal agus in áiseanna cúraim fhadtéarmaigh:



Seachain próifíolacsas fhríthmhiocróbach fada agus neamhriachtanach.




Déan i gcónaí aon chóireáil fhríthmhiocróbach, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an bealach lena thabhairt agus fad na cóireála a thairgeadh i gcairt an othair.



Úsáid antaibheathaigh speictirim cúing nuair is féidir.



Cláir mhaoirseachta fhríthmhiocróbacha a chur chun feidhme.



Déan athrú ó phaireintreach go béal in am trátha nuair is féidir.