



## Uporaba antimikrobnih sredstava: u ustanovama za dugotrajnu skrb



1/20

korisnika primi barem jedno  
antimikrobno sredstvo svaki dan.



7/10

antimikrobnih sredstava  
propisano je za liječenje  
infekcije, a tri od deset za  
profilaksu.



3/4 ciklusa profilakse

dana su za sprječavanje infekcija urinarnog trakta. Iako takva praksa može smanjiti rizik od infekcije u žena, ne postoje dokazi o njezinoj učinkovitosti kada se primjenjuje u velikog broja starijih bolesnika.

Osim toga, ta je praksa povezana s povećanom otpornošću na antimikrobna sredstva. Većina ciklusa profilakse stoga može predstavljati nepotrebnu uporabu antimikrobnih sredstava.

## Rješenja

Oprezna uporaba antimikrobnih sredstava u zdravstvenim ustanovama ključna je za borbu protiv otpornosti na antimikrobna sredstva. U bolnicama i ustanovama za dugotrajnu skrb moguće je provesti sljedeće mjere:



Izbjegavajte produljenu i nepotrebnu antimikrobnu profilaksu.




U kartonu bolesnika uvijek dokumentirajte indikaciju za liječenje antimikrobnim sredstvima, izbor lijeka, dozu, put primjene i trajanje liječenja.



Kad je to moguće, upotrebljavajte antibiotike uskog spektra.



Provodite programe upravljanja uporabom antimikrobnih sredstava.



Napravite pravodobni prijelaz s parenteralne na oralnu primjenu kad je to moguće.