



Antimikrobiális gyógyszerek alkalmazása:

Hosszú távú gondozást végző létesítmények



20-ból 1

gondozott kapott legalább egy antimikrobiális gyógyszert valamelyik napon.



10-ből 7

antimikrobiális gyógyszert fertőzés kezelésére, 10-ből 3-at pedig profilaxis céljára rendeltek el.



4-ből 3

profilaktikus kezelést

húgyúti fertőzések megelőzésére alkalmaztak. Bár ez a gyakorlat csökkentheti a nők körében a fertőzés kockázatát, nincs bizonyíték a hatékonyságára, ha széles körben alkalmazzák idős betegeknek.

Ezen túlmenően ez a gyakorlat megnövekedett antimikrobiális rezisztenciával is társul. A legtöbb profilaktikus kezelés ezért az antimikrobiális szerek szükségtelen használatát jelentheti.

Megoldások

Az antimikrobiális gyógyszerek körültekintő alkalmazása döntő fontosságú az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem szempontjából. A kórházakban és a hosszú távú gondozást végző létesítményekben az alábbi intézkedéseket lehet bevezetni:



Kerülje a tartós és szükségtelen antimikrobiális profilaxist.




Mindig dokumentálja az antimikrobiális kezelés javaslatát, a gyógyszerválasztást, az adagot, az alkalmazás módját és a kezelés időtartamát a beteg kórlapjában.



Lehetőség szerint alkalmazzon keskeny spektrumú antibiotikumokat.



Vezessen be antimikrobiális politikai programokat.



Lehetőség szerint megfelelően időzíttéssel állítsa át a parenterális kezelést orálisra.