



Sýklalyfjanotkun á:

Langtíma umönnunstöðum



1 af 20

vistmönnum fékk að minnsta kosti eitt örverueyðandi lyf á hverjum degi.



7 af 10

sýkingalyfjum voru ávísuð til meðferðar á sýkingu og 3 af 10 sem fyrirbyggjandi meðferð.



3 af 4 af fyrirbyggjandi lyfjagjöf

var til að koma í veg fyrir þvagfærasýkingar. Þó að þessi aðferð kunni að draga úr hættu á sýkingu hjá konum, þá eru engar vísbendingar um árangur af henni þegar henni er beitt almennt á aldraða sjúklinga.

Að auki er tengist þessi aðferð aukni þoli gegn sýkingalyfjum. Flestar fyrirbyggjandi lyfjameðferðir kunna þar af leiðandi að fela í sér sér ónaðsýnlega notkun á sýkingalyfjum.

Lausnir

Varfærin notkun sýklalyfja í heilsugæslustöðum er lykilatriði gegn baráttu gegn auknu sýkingalyfjaþoli. Hægt er að gera eftirfarandi ráðstafanir á sjúkrahúsum og langtíma umönnunstöðum:



Forðast skal langtíma og ónaðsýnlega fyrirbyggjandi meðferð með sýklalyfjum.




Skrásettu ávallt ábendingu fyrir sýklalyfjameðferð, lyfjaval, skammt, inntökuleið og lengd meðferðar í sjúkraskrá sjúklings.



Nota skal þröngvirk sýklalyf þar sem það er hægt.



Innleiða skal sýkingalyfjastjórnunaráætlanir.



Framkvæma skal rétt tímasetta skiptingu frá sprautugjöf til munnlegrar inntöku þar sem það er hægt.