



Gebruik van antimicrobiële middelen in: Instellingen voor langdurige zorg



1 op de 20 bewoners krijgt per dag ten minste één antimicrobieel middel toegediend.



7 op de 10 antimicrobiële middelen werden voorgeschreven ter behandeling van een infectie en 3 op de 10 voor profylaxe.



3 op de 4 profylactische kuren

werden voorgeschreven om urineweginfecties te voorkomen. Hoewel dit bij vrouwen het risico op infectie kan verminderen, is er geen bewijs van de doeltreffendheid ervan wanneer het op brede schaal wordt toegepast op oudere patiënten.

Bovendien wordt deze praktijk in verband gebracht met verhoogde antimicrobiële resistentie. Bij de meeste profylactische kuren worden dus misschien onnodig antimicrobiële middelen gebruikt.

Oplossingen


Voorzichtig gebruik van antimicrobiële middelen in de gezondheidszorg is van cruciaal belang voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. De volgende acties kunnen worden ondernomen in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg:



Vermijd langdurige en onnodige antimicrobiële profylaxe.



Gebruik, indien mogelijk, smalspectrumantibiotica indien mogelijk.



Schakel, indien mogelijk, tijdig over van parenterale naar orale toediening.



Documenteer altijd de indicatie van de antimicrobiële behandeling, geneesmiddelkeuze, dosis, toedieningsweg en duur van de behandeling in het patiëntendossier.



Voer beheerprogramma's (stewardships) voor antimicrobiële middelen in.