



Bruk av antimikrobielle midler i:

langtidsinstitusjoner



1/20

beboere fikk minst ett antimikrobielt middel hver dag.



7/10

av antimikrobielle midler ble foreskrevet for behandling av en infeksjon, og 3 av 10 for profylakse.



3/4 av alle profylaktiske behandlinger

ble gitt for å forebygge urinveisinfeksjoner. Selv om denne praksisen kan redusere risikoen for infeksjon hos kvinner, finnes det ikke bevis for effektiviteten når den brukes i stort omfang på eldre pasienter.

Denne praksisen er dessuten knyttet til økt antimikrobiell resistens. De fleste profylaksebehandlinger kan derfor representere unødvendig bruk av antimikrobielle midler.

Løsninger


Forsiktig bruk av antimikrobielle midler i helsetjenesten er sentralt for å bekjempe antimikrobiell resistens. De følgende tiltak kan gjøres på sykehus og i langtidsinstitusjoner:



Unngå langvarig og unødvendig antimikrobiell profylakse.



Bruk smalspektret antibiotika når det er mulig.



Skifte fra parenteral til oral bruk når det er mulig.



Alltid dokumentere i pasientjournalen: Indikasjonen for antimikrobiell behandling, medisinalvalg, dosering, administrasjonsmetode og varigheten av behandlingen.



Implementere forvaltningsprogram for antimikrobiell behandling.