



Środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w:
Placówkach opieki długoterminowej



1 / 20

pensionariuszy przyjmuje
przynajmniej jeden środek
przeciwdrobnoustrojowy każdego
dnia.



W 7 / 10
przypadków

środki przeciwdrobnoustro-
jowe
przepisano w celu leczenia zakażenia,
a w 3 / 10 – w celach profilaktycznych.




3 / 4 serii profilaktycznych

podaje się w celu zapobiegania zakażeniu układu
moczowego. Podczas gdy praktyka ta może zmniejszyć ryzyko
zakażenia u kobiet, nie ma dowodów na jej skuteczność w
przypadku powszechnego stosowania u starszych pacjentów.

Co więcej, praktyka ta jest powiązana ze zwiększoną
opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
W związku z tym większość cykli profilaktycznych
może stanowić niepotrzebne stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych.

Rozwiązania

Ostrożne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w opiece zdrowotnej jest kluczowe dla celów zwalczania oporności przeciwdrobnoustrojowej. Należy podjąć następujące działania w szpitalach i placówkach opieki długoterminowej:



Unikać przedłużającej się i
niepotrzebnej profilaktyki
przeciwdrobnoustrojowej.




Zawsze wpisywać w karcie
pacjenta informacje dotyczące
wskazań do leczenia środkami
przeciwdrobnoustrojowymi, wyboru leku,
dawki, drogi podania i czasu trwania
leczenia.



Używać antybiotyków o wąskim
spektrum działania, kiedy tylko
jest to możliwe.



Stosować programy
zarządzania leczeniem środkami
przeciwdrobnoustrojowymi.



Dokonywać zmiany z podawania
pozajelitowego na doustne, kiedy
tylko jest to możliwe.