



Folosirea antimicrobienelor în:  
Unitățile de îngrijiri pe termen lung



1 din 20

de rezidenți era tratat zilnic  
cu cel puțin un medicament  
antimicrobian.



7 din 10

antimicrobiene  
erau prescrise pentru tratamentul  
unei infecții și 3 din 10 în profilaxie.



3 / 4 din profilaxii

erau administrate pentru prevenirea infecțiilor urinare. Deși această practică poate reduce riscul de infecție la femei, eficacitatea administrării lor extinse la pacienți vârstnici nu este dovedită.

În plus, această practică este asociată cu creșterea rezistenței la antimicrobiene. Prin urmare, majoritatea profilaxiilor pot reprezenta utilizări inutile ale antimicrobienelor.

## Soluții


Folosirea prudentă a antimicrobienelor în unitățile sanitare este esențială în lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene. În spitale și unități de îngrijiri pe termen lung pot fi luate următoarele măsuri:



Evitați profilaxiile prelungite și inutile cu antimicrobiene.



Folosiți pe cât posibil  
antibiotice cu spectru îngust.



Când este posibil, treceți la momentul  
optim de la administrarea parenterală  
la cea orală.



Documentați întotdeauna în fișa  
pacientului indicația tratamentului  
antimicrobian, medicamentul, doza, calea  
de administrare și durata tratamentului.



Introduceți programe de gestionare  
judicioasă a antimicrobienelor.