



Používanie antimikrobiálnych látok v: zariadeniach dlhodobej starostlivosti



1 z 20 pacientov dostáva každý deň
aspoň jednu antimikrobiálnu látku.



7 z 10
antimikrobiálnych
látok
bolo predpísaných na
liečbu infekcie a 3 z 10
ako prevencia.




3 z 4 preventívne podávaných liekov

sa použili na prevenciu zápalu močových ciest. Takouto liečbou sa síce môže znížiť riziko infekcie u žien, ale neexistujú dôkazy o účinnosti pri bežnom používaní u starších pacientov.

Navyše tento postup vedie k zvyšovaniu rezistencie na antimikrobiálne látky. Profylaktická liečba preto zvyčajne znamená nadbytočné používanie antimikrobiálnych látok.

Riešenia

Obozretné používanie antimikrobiálnych látok je kľúčový prvok v boji proti rezistencii na antimikrobiálne látky. V nemocniciach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti sa môžu podniknúť tieto kroky:



Zabrániť predĺženému a
zbytočnému používaniu
antimikrobiálnej profylaxie.




Vždy zdokumentovať indikáciu liečby
antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob
podávania a dobu trvania liečby do
zdravotnej karty pacienta.



Uprednostniť podľa možnosti
cielené antibiotiká.



Realizovať programy uvážlivého
používania antimikrobiálnych látok.



Prejsť čo najskôr z parenterálneho na
perorálne podávanie, ak je to možné.