



## Antimikrobiella läkemedel i: Inrättningar för långtidsvård



**1 av 20** av alla personer boende på inrättningar för långtidsvård fick minst ett antimikrobiellt läkemedel varje dag.



**7 av 10**

av alla antimikrobiella läkemedel ordinerades för behandling av en infektion och 3 av 10 för profylax (förebyggande).



## Tre fjärdedelar

av alla profylaxbehandlingar

gavs för att förhindra urinvägsinfektioner. Denna praxis kan minska risken för infektioner hos kvinnor, men det finns inga belegg för att den är effektiv när den tillämpas i stor skala på äldre patienter.

Dessutom förknippas det här bruket med en ökad risk för antimikrobiell resistens. De flesta profylaxbehandlingar kan därför innebära en onödig användning av antimikrobiella medel.

## Lösningar


För att bekämpa antimikrobiell resistens är det avgörande att använda antimikrobiella medel återhållsamt i vårdmiljön. Följande åtgärder kan vidtas på sjukhus och vid inrättningar för långtidsvård:



Undvik långvarig och onödig antimikrobiell profylax.



Använd smalspektrumantibiotika när så är möjligt.



Byt i god tid från parenteral till oral administrering när så är möjligt.



Dokumentera alltid indikationen för antimikrobiell behandling, val av läkemedel, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen i patientjournalen .



Genomför strategiprogram för antimikrobiell läkemedelsbehandling.