

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos – grėsmė Europos pacientų saugumui

2016 ir 2017 m. ECDC koordinavo infekcijų paplitimo tyrimus, kuriais siekta surinkti duomenų apie su sveikatos priežiūra susijusias (SSPS) infekcijas ES ir (arba) EEE valstybių ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros įstaigose. Nors kai kurios SSPS infekcijos lengvai gydomos, kitos gali turėti rimtesnių pasekmių paciento sveikatai, todėl jomis sergantys pacientai praleidžia daugiau laiko ligoninėse ir dėl to didėja ligoninių išlaidos. Europoje vien ligoninėse nuo SSPS infekcijų miršta daugiau žmonių nei nuo bet kurios kitos ECDC stebimos infekcinės ligos.

Bet kurią dieną



1 iš 15
ligoninės pacientų
serga bent viena SSPS
infekcija

98 000
pacientų serga bent
viena SSPS infekcija.



1 iš 26
ilgalaikės priežiūros
įstaigos gyventojų serga
bent viena SSPS infekcija.

130 000
gyventojų serga bent
viena SSPS infekcija.


Faktai

Kasmet Europos ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros įstaigose užregistruojama iš viso apytikriai 8,9 mln. SSPS infekcijų atvejų.


SSPS infekcijos, kuriomis užsikrečiama ligoninėse (pvz., pneumonija, chirurginių žaizdų infekcijos ir kraujotakos infekcijos), paprastai yra sunkesnės už SSPS infekcijas, kuriomis užsikrečiama ilgalaikės priežiūros įstaigose (kitas kvėpavimo takų infekcijas, išskyrus pneumoniją, šlapimo takų infekcijas ir odos bei minkštųjų audinių infekcijas).

Manoma, kad daugiau kaip pusės tam tikrų SSPS infekcijų galima išvengti.

8,9 mln. SSPS
infekcijų atvejų



Ligoninės
Ilgalaikės
priežiūros
įstaigos



Ėminiai mikrobiologiniam
tyrimui atlikti

Neretai SSPS infekcijos gydomos nepaėmus ėminių mikrobiologiniam tyrimui atlikti arba ištyrus mėginius nenustatoma infekcijos sukėlėjo.



Mikroorganizmai

Ligoninėse SSPS infekciją sukėlęs mikroorganizmas nustatytas 53 proc. atvejų, o ilgalaikės priežiūros įstaigose – tik 19 proc.



Atsparumas anti-
biotikams

Viena iš 3 bakterijų, sukėlusių SSPS infekcijas, – tiek ligoninėse, tiek ilgalaikės priežiūros įstaigose – buvo atspari antibiotikams.

Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų galima išvengti:



vykdant infekcijų prevenciją ir kontrolę, pvz., laikantis rankų higienos taisyklių, tikrinant, ar pacientas nėra daugeliui vaistų atsparios bakterijos nešiotojas arba ja užsikrėtęs, ir atskiriant tokių bakterijų nešiotojus ir (arba) jomis užsikrėtusius pacientus nuo kitų žmonių;



vykdant antimikrobinio gydymo priežiūros programas;



rengiant mokymus visiems sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams;



geriau informuojant pacientus, ilgalaikės priežiūros įstaigų gyventojus ir jų šeimos narius apie priemones, kurių jie gali imtis siekdami išvengti SSPS infekcijų, ir kaip reikėtų racionaliai vartoti antibiotikus;



vykdant SSPS infekcijų stebėjimą vietas ir nacionaliniu lygmenimis;



dažniau naudojantis mikrobiologinių tyrimų laboratorijų paslaugomis ligoninėse ir ypač ilgalaikės priežiūros įstaigose.