



Uporaba antimikrobikov:

## Ustanove za dolgotrajno oskrbo



1 od 20

oskrbovancev je na dnevni ravni prejel vsaj eno antimikrobično zdravilo.



7 od 10

antimikrobikov je bilo predpisanih za zdravljenje okužbe, trije od desetih pa za preventivno zdravljenje.



3 od 4 ciklov preventivnega zdravljenja

so bili bolnikom dani za namene preprečevanja okužb sečil. Čeprav lahko takšna praksa zmanjša tveganje za okužbo pri ženskah, pa ni dokazov o njeni učinkovitosti, kadar se širše izvaja pri starejših bolnikih.

Tovrstna praksa je poleg tega povezana z večjo odpornostjo proti antimikrobikom. Večina ciklov preventivnega zdravljenja zato predstavlja nepotrebno uporabo antimikrobikov.

## Rešitve

Preudarna raba antimikrobikov v zdravstvenih ustanovah je osrednjega pomena v boju proti odpornosti na antimikrobike. Bolnišnice in ustanove za dolgotrajno oskrbo lahko sprejmejo naslednje ukrepe:



Izogibanje dolgotrajnejšemu in nepotrebemu preventivnemu zdravljenju z antimikrobi.




V bolnikovi kartoteki je treba zdravljenje z antimikrobi vedno dokumentirati, vključno z vrsto izbranega zdravila, odmerjanjem, načinom dajanja zdravila in trajanjem zdravljenja.



Če je le mogoče, je treba poseči po antibiotikih z ožjim spektrom delovanja.



Izvajati je treba programe usmerjanja rabe antimikrobikov.



Pravočasno je treba preiti s parenteralnega na peroralno zdravljenje, če je to mogoče.